

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
«Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)»**

МАТЕМАТИКА

Тождественные преобразования. Решение уравнений

Задание №1 для 8-х классов

(2013 – 2014 учебный год)



г. Долгопрудный, 2013

Составитель: Т.Х. Яковлева, старший преподаватель кафедры высшей математики МФТИ.

Математика: задание №1 для 8-х классов (2013 – 2014 учебный год), 2013, 20 с.

Дата отправления заданий по физике и математике – 15 октября 2013 г.

Составитель:

Яковлева Тамара Харитоновна

Подписано в печать 05.06.13. Формат 60×90 1/16.

Бумага типографская. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 1,25. Уч.-изд. л. 1,11. Тираж 1400. Заказ №2-з.

Заочная физико-техническая школа
Московского физико-технического института
(государственного университета)

ООО «Печатный салон ШАНС»

Институтский пер., 9, г. Долгопрудный, Московская обл., 141700.
ЗФТШ, тел./факс (495) 408-51-45 – **заочное отделение**,
тел./факс (498) 744-6 3-51 – **очно-заочное отделение**,
тел. (498) 744-65-83 – **очное отделение**.

e-mail: zftsh@mail.mipt.ru

Наш сайт: www.school.mipt.ru

© ЗФТШ , 2013

Вступление

Дорогие ребята! Поздравляем вас с поступлением в Федеральную заочную физико-техническую школу. Вы получили первое задание по математике, в нем мало сложных задач, советуем вам внимательно изучить разработку, без ошибок ответить на контрольные вопросы и постараться решить предложенные вам задачи. Мало знать, как решить задачу, главное – уметь довести решение до конца и при этом не допустить арифметических ошибок. Не огорчайтесь, если вы не сможете справиться со всеми задачами. Вам вышлют решение задания, вы сможете посмотреть, как следует решать ту или иную задачу. В некоторых задачах мы указываем название учебного заведения (например, МГУ или МФТИ). Это означает, что данная задача предлагалась там на вступительных экзаменах.

Обратите внимание как оформлены решения в присланных вам заданиях и как записывают решения задач в ваших учебниках и задачаниках.

Грамотный человек должен быть грамотным во всех предметах. Не забывайте о правилах грамматики, особенно о точках и запятых в ваших решениях. Постарайтесь аккуратно оформлять ваши решения.

Мы очень надеемся, что поможем вам в изучении математики. Рады будем видеть вас в будущем студентами нашего института.

Желаем вам больших успехов в этом году!

§1. Тожественные преобразования

В математике встречаются два вида математических выражений – числовые выражения и выражения с переменными. Примерами *числовых* являются выражения $3,8 - 2,1\left(\frac{5}{7} - \frac{3}{4}\right)$, $2 + 5(38 : 9)$.

Выражения вида $2x + 1$, $3x^2 + 5$ называются *выражениями с одной переменной*. Выражение может содержать и несколько переменных, например, $2x^2y + xyz^3$, $5a^2b(x - y)^2$, $3t^2 + v^3 + 1$.

Если в выражение с переменными подставить вместо переменных конкретные числа, то получим числовое выражение. После выполнения всех действий с числами получится число, которое называют *значением* выражения с переменными при выбранных значениях переменных.

Значения переменных, при которых выражение имеет смысл, т. е. выполняются все указанные действия, называются *допустимыми значениями переменных*.

Значения двух выражений с переменными при одних и тех же значениях переменных называются *соответственными значениями выражений*. Например, соответственными значениями выражений $2x^2 + 1$ и $3x^3 + 5x + 1$ при $x = 1$ являются числа 3 и 9.

Два выражения (числовые или с переменными), соединенные знаком $=$, называют *равенством*. Числовые равенства могут быть верными и неверными. Равенства с переменными могут быть верными при одних значениях переменных и неверными при других значениях.

Равенство, верное при всех допустимых значениях входящих в него переменных, называется *тождеством*.

Два выражения, принимающие равные соответственные значения при всех допустимых значениях переменных, называют *тождественно равными*.

Замену одного выражения другим, ему тождественно равным, называют *тождественным преобразованием* или просто преобразованием выражения.

Выражения, составленные из чисел и переменных с помощью конечного числа знаков арифметических операций (сложения, вычитания, умножения, деления), называются *рациональными* выражениями. Рациональное выражение называется *целым*, если оно не содержит деления на выражение с переменными.

Примерами целых выражений являются одночлены и многочлены.

Одночленами называются числа, произведения чисел и натуральных степеней переменных, например, выражения 9 , $25x^2$, $34abxy^4$ являются одночленами.

Для приведения одночлена к стандартному виду перемножают все входящие в него числовые множители, а произведения одинаковых переменных (или их степеней) заменяют степенью этой переменной.

Числовой множитель называется коэффициентом одночлена, а сумму показателей степеней переменных называют степенью одночлена. Если одночлен является числом или произведением чисел, то его называют одночленом нулевой степени.

Например, стандартным видом одночлена $0,3bxy(-2)a^2x^2y^3$ является одночлен $-0,6a^2bx^3y^4$, число $-0,6$ является его коэффициентом, степень одночлена равна 10.

Многочленом называют сумму одночленов. Одночлен является частным случаем многочлена.

Одночлены называют подобными одночленами, если после их приведения к стандартному виду они оба либо совпадают, либо отличаются коэффициентами. Например, одночлены $2ax^2y$ и $-5ax^2y$ являются подобными.

Преобразование многочлена, при котором производится сложение и вычитание подобных членов, называется *приведением подобных*.

Например, $2ax + 3by - ax + 0,5by = ax + 3,5by$.

Для приведения многочлена к *стандартному виду* каждый из входящих в него одночленов заменяют одночленом стандартного вида и приводят подобные члены.

Степенью многочлена называют наибольшую из степеней одночленов, составляющих многочлен после приведения его к стандартному виду, например, стандартным видом многочлена

$$2ax^5 + xy^3 + 3xy^3 - 2ax^5 + 5$$

является многочлен $4xy^3 + 5$, его степень равна 4.

Произведение двух многочленов равно сумме произведений каждого члена первого многочлена на каждый член второго многочлена.

Например, $(x + y)(2x^2 - y) = 2x^3 + 2x^2y - xy - y^2$.

Разложить многочлен на множители означает представить его в виде произведения многочленов.

При разложении многочлена на множители используют метод вынесения общего множителя за скобки и метод группировки членов.

Пример 1. Разложить на множители многочлен

$$2x^2y + y^2 - 2x^3 - yx.$$

△ Группируя члены многочлена (т. е. представляя его в виде суммы двух многочленов) и вынося общий множитель в каждой группе, получаем

$$2x^2y + y^2 - 2x^3 - yx = (2x^2y - 2x^3) + (y^2 - yx) = 2x^2(y - x) + y(y - x).$$

Видим, что многочлен $y - x$ является общим множителем для обоих слагаемых. Вынося этот многочлен за скобки, окончательно получаем

$$2x^2y + y^2 - 2x^3 - yx = (y - x)(2x^2 + y). \blacktriangle$$

При тождественных преобразованиях многочленов часто используют формулы, носящие название «формулы сокращенного умножения»:

$$1. a^2 - b^2 = (a - b)(a + b). \quad 2. a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2).$$

3. $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$. 4. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

5. $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. 6. $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$.

7. $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$.

Пример 2. Разложить на множители многочлен $x^3 + x^2 + x - 3$.

Δ Покажем, как, последовательно используя метод группировки, формулы 2 и 1 и метод вынесения общего множителя, можно разложить на множители данный многочлен:

$$\begin{aligned} x^3 + x^2 + x - 3 &= (x^3 - 1) + (x^2 - 1) + (x - 1) = \\ &= (x-1)(x^2 + x + 1) + (x-1)(x+1) + (x-1) = \\ &= (x-1)(x^2 + x + 1 + x + 1 + 1) = (x-1)(x^2 + 2x + 3). \blacktriangle \end{aligned}$$

Пример 3. Разложить на множители многочлен $3x^2y^4 - 24x^5y$.

Δ Сначала выносим общий множитель $3x^2y$ за скобку:

$$3x^2y^4 - 24x^5y = 3x^2y(y^3 - 8x^3).$$

Затем к многочлену $y^3 - 8x^3$ применим формулу для разности кубов:

$$y^3 - 8x^3 = (y - 2x)(y^2 + 2xy + 4x^2).$$

В результате получим

$$3x^2y^4 - 24x^5y = 3x^2y(y - 2x)(y^2 + 2xy + 4x^2). \blacktriangle$$

Пример 4. Разложить на множители многочлен

$$27x^3 + y^3 + 3y^2 + 3y + 1.$$

Δ Заметим, что $y^3 + 3y^2 + 3y + 1 = (y+1)^3$, а $27x^3 = (3x)^3$, тогда получаем $(3x)^3 + (y+1)^3$. Применяем формулу 3, получим

$$(3x)^3 + (y+1)^3 = (3x + y + 1)(9x^2 - 3x(y+1) + (y+1)^2).$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} 27x^3 + y^3 + 3y^2 + 3y + 1 &= \\ &= (3x + y + 1)(9x^2 - 3xy - 3x + y^2 + 2y + 1). \blacktriangle \end{aligned}$$

§2. Выделение полного квадрата из квадратного трёхчлена

Выражения вида $2x^2 + 3x + 5$, $-4x^2 + 5x + 7$ носят название квадратного трёхчлена. В общем случае квадратным трёхчленом называют выражение вида $ax^2 + bx + c$, где a, b, c – произвольные числа, причём $a \neq 0$.

Рассмотрим квадратный трёхчлен $x^2 - 4x + 5$. Запишем его в таком виде: $x^2 - 2 \cdot 2 \cdot x + 5$. Прибавим к этому выражению 2^2 и вычтем 2^2 . получаем: $x^2 - 2 \cdot 2 \cdot x + 2^2 - 2^2 + 5$. Заметим, что $x^2 - 2 \cdot 2 \cdot x + 2^2 = (x - 2)^2$, поэтому $x^2 - 4x + 5 = (x - 2)^2 - 4 + 5 = (x - 2)^2 + 1$. Преобразование, которое мы сделали, носит название «выделение полного квадрата из квадратного трёхчлена».

Пример 1. Выделите полный квадрат из квадратного трёхчлена

$$9x^2 + 3x + 1.$$

△ Заметим, что $9x^2 = (3x)^2$, $3x = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3x$. Тогда $9x^2 + 3x + 1 = (3x)^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3x + 1$. Прибавим и вычтем к полученному выражению

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2, \text{ получаем } \left((3x)^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3x + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right) + 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \left(3x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}. \blacktriangle$$

Покажем, как применяется метод выделения полного квадрата из квадратного трёхчлена для разложения квадратного трёхчлена на множители.

Пример 2. Разложить на множители квадратный трёхчлен

$$4x^2 - 12x + 5.$$

△ Выделяем полный квадрат из квадратного трёхчлена:

$$(2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 - 3^2 + 5 = (2x - 3)^2 - 4 = (2x - 3)^2 - 2^2.$$

Теперь применяем формулу $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$, получаем:

$$(2x - 3 - 2)(2x - 3 + 2) = (2x - 5)(2x - 1). \blacktriangle$$

Пример 3. Разложить на множители квадратный трёхчлен

$$-9x^2 + 12x + 5.$$

△ $-9x^2 + 12x + 5 = -(9x^2 - 12x) + 5$. Теперь замечаем, что $(9x^2) = (3x)^2$, $-12x = -2 \cdot 3x \cdot 2$. Прибавляем к выражению $9x^2 - 12x$ слагаемое 2^2 , получаем:

$$\begin{aligned} & -\left((3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 2 + 2^2 - 2^2\right) + 5 = -\left((3x - 2)^2 - 4\right) + 5 = \\ & = -\left(3x - 2\right)^2 + 4 + 5 = -(3x - 2)^2 + 9 = 3^2 - (3x - 2)^2. \end{aligned}$$

Применяем формулу для разности квадратов, имеем:

$$-9x^2 + 12x + 5 = (3 - (3x - 2))(3 + (3x - 2)) = (5 - 3x)(3x + 1). \blacktriangle$$

Покажем, как применяется метод выделения полного квадрата для нахождения наибольшего или наименьшего значений квадратного трёхчлена.

Рассмотрим квадратный трёхчлен $x^2 - x + 3$. Выделяем полный квадрат: $(x)^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 3 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{11}{4}$. Заметим, что при

$x = \frac{1}{2}$ значение квадратного трёхчлена равно $\frac{11}{4}$, а при $x \neq \frac{1}{2}$ к значению $\frac{11}{4}$ добавляется положительное число, поэтому получаем число,

большее $\frac{11}{4}$. Таким образом, наименьшее значение квадратного трёхчлена равно $\frac{11}{4}$, и оно получается при $x = \frac{1}{2}$.

Пример 4. Найдите наибольшее значение квадратного трёхчлена $-16x^2 + 8x + 6$.

Пример 4. Найдите наибольшее значение квадратного трёхчлена $-16x^2 + 8x + 6$.

△ Выделяем полный квадрат из квадратного трёхчлена:

$$\begin{aligned} -16x^2 + 8x + 6 &= -\left((4x)^2 - 2 \cdot 4x \cdot 1 + 1 - 1\right) + 6 = \\ &= -\left((4x - 1)^2 - 1\right) + 6 = -(4x - 1)^2 + 7. \end{aligned}$$

При $x = \frac{1}{4}$ значение квадратного трёхчлена равно 7, а при $x \neq \frac{1}{4}$ из числа 7 вычитается положительное число, то есть получаем число, меньшее 7. Таким образом, число 7 является наибольшим значением квадратного трёхчлена, и оно получается при $x = \frac{1}{4}$. ▲

Пример 5. Разложите на множители числитель и знаменатель дроби $\frac{x^2 + 2x - 15}{x^2 - 6x + 9}$ и сократите эту дробь.

△ Заметим, что знаменатель дроби $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$.

Разложим числитель дроби на множители, применяя метод выделения полного квадрата из квадратного трёхчлена.

$$\begin{aligned}x^2 + 2x - 15 &= (x)^2 + 2 \cdot x \cdot 1 + 1 - 1 - 15 = (x+1)^2 - 16 = (x+1)^2 - 4^2 = \\ &= (x+1+4)(x+1-4) = (x+5)(x-3).\end{aligned}$$

Данную дробь привели к виду $\frac{(x+5)(x-3)}{(x-3)^2}$, после сокращения на

$(x-3)$ получаем $\frac{(x+5)}{(x-3)}$. ▲

Пример 6. Разложите многочлен $x^4 - 13x^2 + 36$ на множители.

△ Применим к этому многочлену метод выделения полного квадрата.

$$\begin{aligned}x^4 - 13x^2 + 36 &= (x^2)^2 - 2 \cdot x^2 \cdot \frac{13}{2} + \left(\frac{13}{2}\right)^2 - \left(\frac{13}{2}\right)^2 + 36 = \\ &= \left(x^2 - \frac{13}{2}\right)^2 - \frac{169}{4} + 36 = \left(x^2 - \frac{13}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} = \left(x^2 - \frac{13}{2}\right)^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \\ &= \left(x^2 - \frac{13}{2} - \frac{5}{2}\right) \left(x^2 - \frac{13}{2} + \frac{5}{2}\right) = (x^2 - 9)(x^2 - 4) = \\ &= (x-3)(x+3)(x-2)(x+2). \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Пример 7. Разложите на множители многочлен $4x^2 + 4xy - 3y^2$.

△ Применяем метод выделения полного квадрата. Имеем:

$$\begin{aligned}(2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot y + y^2 - y^2 - 3y^2 &= (2x+y)^2 - (2y)^2 = \\ &= (2x+y+2y)(2x+y-2y) = (2x+3y)(2x-y). \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

Пример 8. Применяя метод выделения полного квадрата, разложите на множители числитель и знаменатель и сократите дробь

$$\begin{aligned}&\frac{8x^2 + 10x - 3}{2x^2 - x - 6}. \\ \triangle 8x^2 + 10x - 3 &= 8\left(x^2 + \frac{10}{8}x - \frac{3}{8}\right) = \\ &= 8\left(x^2 + 2 \cdot \frac{5}{8}x + \left(\frac{5}{8}\right)^2 - \left(\frac{5}{8}\right)^2 - \frac{3}{8}\right) = 8\left(\left(x + \frac{5}{8}\right)^2 - \frac{25}{64} - \frac{24}{64}\right) =\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 8 \left(\left(x + \frac{5}{8} \right)^2 - \left(\frac{7}{8} \right)^2 \right) = 8 \left(x + \frac{5}{8} + \frac{7}{8} \right) \left(x + \frac{5}{8} - \frac{7}{8} \right) = \\
 &= 8 \left(x + \frac{12}{8} \right) \left(x - \frac{2}{8} \right) = 8 \left(x + \frac{3}{2} \right) \left(x - \frac{1}{4} \right) = (2x+3)(4x-1).
 \end{aligned}$$

Преобразуем знаменатель дроби:

$$\begin{aligned}
 2x^2 - x - 6 &= 2 \left(x^2 - \frac{x}{2} - \frac{6}{2} \right) = 2 \left(x^2 - 2 \cdot \frac{1}{4}x + \left(\frac{1}{4} \right)^2 - \left(\frac{1}{4} \right)^2 - \frac{6}{2} \right) = \\
 &= 2 \left(\left(x - \frac{1}{4} \right)^2 - \left(\frac{7}{4} \right)^2 \right) = 2 \left(x - \frac{1}{4} - \frac{7}{4} \right) \left(x - \frac{1}{4} + \frac{7}{4} \right) = \\
 &= 2(x-2) \left(x + \frac{3}{2} \right) = (x-2)(2x+3).
 \end{aligned}$$

Имеем: $\frac{(2x+3)(4x-1)}{(x-2)(2x+3)} = \frac{4x-1}{x-2}$. ▲

§3. Уравнения с одной переменной

Равенство, содержащее переменную, называют *уравнением с одной переменной* или уравнением с одним неизвестным. Например, уравнением с одной переменной является равенство $2(3x+5) = 4x-1$. *Корнем* или *решением* уравнения называется значение переменной, при котором уравнение обращается в верное числовое равенство. Например, число 1 является решением уравнения $3x+5=9x-1$. Уравнение $x^2+1=0$ не имеет решений, т. к. левая часть уравнения всегда больше нуля. Уравнение $(x-1)(x+2)=0$ имеет два корня: $x_1=1$ и $x_2=-2$.

Решить уравнение – значит найти все его корни или доказать, что корней нет.

Уравнения называются *равносильными*, если каждое решение первого уравнения является решением второго и каждое решение второго уравнения является решением первого или если оба уравнения не имеют решений.

При решении уравнений используют следующие свойства:

1) если в уравнении перенести слагаемое из одной части в другую, изменив его знак, то получится уравнение, равносильное данному;

2) если обе части уравнения умножить или разделить на одно и то же отличное от нуля число, то получится уравнение, равносильное данному.

Уравнение вида $ax = b$, где x – переменная, a и b – некоторые числа, называется *линейным уравнением* с одной переменной.

Если $a \neq 0$, то уравнение имеет единственное решение $x = \frac{b}{a}$.

Если $a = 0$ и $b = 0$, то уравнению удовлетворяет любое значение x , а если $a = 0$, $b \neq 0$, то уравнение не имеет решений, т. к. $0 \cdot x = b$ не выполняется ни при одном значении переменной.

Пример 1. Решите уравнение

$$2,5x - (x + 1) = (3x - 1) - 2x + 1.$$

Δ Раскроем скобки в обеих частях уравнения, перенесем все слагаемые с x в левую часть уравнения, а слагаемые, не содержащие x , в правую часть, получаем:

$$2,5x - x - 3x + 2x = 1 - 1 + 1. \quad 0,5x = 1, \quad x = 2.$$

Ответ: 2. \blacktriangle

Пример 2. Решите уравнение:

а) $2x^2 - 3x = 0$; б) $x^3 - 2x^2 - 9x + 18 = 0$; в) $x^2 + 5x + 6 = 0$.

Δ а) Преобразуем уравнение: $x(2x - 3) = 0$. Произведение равно нулю, если один из сомножителей равен нулю, получаем $x_1 = 0$, $x_2 = \frac{3}{2}$.

Ответ: 0; $\frac{3}{2}$.

б) Разложим на множители левую часть уравнения:

$$x^2(x - 2) - 9(x - 2) = (x - 2)(x^2 - 9) = (x - 2)(x - 3)(x + 3).$$

Отсюда видно, что решениями этого уравнения являются числа

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 3, \quad x_3 = -3.$$

Ответ: 2; 3; -3.

в) Это уравнение называется квадратным, вы подробно изучите эти уравнения в 8-м классе. Но покажем, как можно решать такие уравнения. Представим $5x$ как $2x + 3x$, тогда имеем:

$$\begin{aligned} x^2 + 2x + 3x + 6 &= 0, \\ x(x + 2) + 3(x + 2) &= 0, \quad (x + 2)(x + 3) = 0, \end{aligned}$$

отсюда видно, что $x_1 = -2$, $x_2 = -3$.

Это уравнение можно решать и методом выделения полного квадрата.

Представим выражение $5x = 2 \cdot \frac{5}{2}x$. И прибавим и вычтем в левой части

уравнения число $\frac{25}{4}$, получаем:

$$x^2 + 2 \cdot \frac{5}{2} \cdot x + \frac{25}{4} - \frac{25}{4} + 6 = 0, \left(x + \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} + 6 = 0,$$

$$\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} = 0, \left(x + \frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 0,$$

$$\left(x + \frac{5}{2} - \frac{1}{2}\right)\left(x + \frac{5}{2} + \frac{1}{2}\right) = 0, (x+2)(x+3) = 0.$$

Откуда следует, что $x_1 = -2$ и $x_2 = -3$.

Ответ: $-2; -3$. ▲

Пример 3. Являются ли данные уравнения равносильными:

а) $|x-1| = 2$ и $2x-5=1$;

б) $\frac{(x-3)(x+7)}{x-3} = 0$ и $(x-3)(x+7) = 0$.

Δ а) Если $|x-1| = 2$, то $x-1=2$, $x=3$, или $x-1=-2$, $x=-1$. Первое уравнение имеет два решения: -1 и 3 .

Второе уравнение имеет одно решение $x=3$. Число (-1) является решением первого уравнения и не является решением второго уравнения, следовательно, данные уравнения не являются равносильными.

б) Число $x=3$ является решением второго уравнения и не является решением первого уравнения, т. к. при $x=3$ не определена дробь, стоящая в левой части первого уравнения, поэтому данные уравнения не являются равносильными. ▲

§4. Модуль числа

Дадим определение модуля числа. Если число положительное, то его модуль равен самому числу. Например, $|2,5| = 2,5$; $\left|1\frac{3}{4}\right| = 1\frac{3}{4}$. Если

число отрицательное, то его модуль равен противоположному числу.

Например, $|-3,1| = 3,1$; $\left|-2\frac{3}{7}\right| = 2\frac{3}{7}$.

Модуль нуля равен нулю.

Запишем определение модуля таким образом: $|x| = \begin{cases} x, & \text{если } x \geq 0, \\ -x, & \text{если } x < 0. \end{cases}$

Докажем некоторые свойства модуля.

Свойство 1. Для любого числа x выполняется условие $|x| \geq 0$.

Действительно, если $x > 0$, то $|x| = x$ и тогда $|x| > 0$. Если $x < 0$, то $|x| = -x$, но $-x > 0$, значит $|x| > 0$. И если $x = 0$, то $|x| = 0$.

Таким образом, $|x| \geq 0$ для любого x . При этом заметим, что $|x| > 0$, если $x \neq 0$, и $|x| = 0$, если $x = 0$.

Пример 1. При каких значениях x выполняются равенства:

а) $|x| = 5$; б) $|x| = -3$; в) $|x-1| = 2$?

а) Если x положительное, то $x = 5$; если x отрицательное, то $-x = 5$, т. е. $x = -5$.

б) По свойству 1 выполняется условие $|x| \geq 0$, а у нас условие $|x| = -3 < 0$. Следовательно, не существует чисел, для которых выполнялось бы данное условие.

в) По определению модуля числа следует, что если $x-1 \geq 0$, т. е. $x \geq 1$, то $|x-1| = x-1 = 2$, отсюда следует, что $x = 3$. Если же $x < 1$, то $x-1 < 0$ и $|x-1| = -(x-1)$, получаем равенство $-x+1 = 2$, $-x = 1$, $x = -1$. В дальнейшем мы такие уравнения будем решать коротко, а именно, рассуждаем так: если модуль какого-то выражения равен 2, то либо это выражение равно 2, либо равно (-2) . Если $|x-1| = 2$, то получаем два случая: $x-1 = 2$, $x = 3$ и $x-1 = -2$, $x = -1$. ▲

Свойство 2. Для любых чисел x и y выполняется условие

$$|xy| = |x| \cdot |y|.$$

Если числа x и y положительные, то $xy > 0$, $|xy| = xy$, $|x| = x$, $|y| = y$, получаем верное равенство $xy = xy$.

Если числа x и y отрицательные, то $xy > 0$, $|xy| = xy$, $|x| = -x$, $|y| = -y$, получаем верное равенство $xy = (-x)(-y)$, $xy = xy$.

Если $x > 0$, а $y < 0$, то $xy < 0$, $|xy| = -xy$, $|x| = x$, $|y| = -y$, получаем верное равенство $-xy = -xy$.

Аналогично доказывается, если $x < 0$, а $y > 0$.

Если одно из чисел x и y равно нулю, то обе части равенства $|xy| = |x| \cdot |y|$ равны нулю, т. е. равенство верное.

Пример 2. При каких значениях x верно равенство $|-5x - 10| = 15$.

Δ $|-5x - 10| = |-5(x + 2)| = |-5| \cdot |x + 2| = 5|x + 2|$. Таким образом, получили равенство $5|x + 2| = 15$, $|x + 2| = 3$, отсюда следует, что

$$x + 2 = 3, \quad x = 1 \quad \text{и} \quad x + 2 = -3, \quad x = -5.$$

Ответ: 1; -5. \blacktriangle

Аналогично свойству 2 можно доказать свойство $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$. Исходя из определения модуля числа, можно доказать, что для любого числа x верно равенство $|x| = |-x|$.

Пример 3. Решите уравнение $|-3x - 1| - 2x = 2$.

Δ $|-3x - 1| = \left|-3\left(x + \frac{1}{3}\right)\right| = |-3| \cdot \left|x + \frac{1}{3}\right| = 3\left|x + \frac{1}{3}\right|$. После этих преобразований получили уравнение $3 \cdot \left|x + \frac{1}{3}\right| - 2x = 2$. Из определения модуля следует, что $\left|x + \frac{1}{3}\right| = x + \frac{1}{3}$, если $x + \frac{1}{3} \geq 0$, т. е. $x \geq -\frac{1}{3}$ и $\left|x + \frac{1}{3}\right| = -x - \frac{1}{3}$, если $x < -\frac{1}{3}$.

а) Если $x \geq -\frac{1}{3}$, то получаем уравнение $3\left(x + \frac{1}{3}\right) - 2x = 2$, $x + 1 = 2$, $x = 1$. Число $1 > -\frac{1}{3}$, поэтому число $x = 1$ является решением уравнения.

б) Если $x < -\frac{1}{3}$, то получаем уравнение $3\left(-x - \frac{1}{3}\right) - 2x = 2$, $-5x = 3$,
 $x = -\frac{3}{5} < -\frac{1}{3}$. **Ответ:** $-\frac{3}{5}; 1$. ▲

Пример 4. Решите уравнение

$$|x-1| + |x+1| = 2.$$

△ Напомним определение модуля числа: $|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases}$

В данном уравнении под знаком модуля стоят числа $x-1$ и $x+1$. Если x меньше, чем -1 , то число $x+1$ отрицательное, тогда $|x+1| = -x-1$. А если $x > -1$, то $|x+1| = x+1$. При $x = -1$ имеем

$|x+1| = 0$. Таким образом, $|x+1| = \begin{cases} x+1, & x \geq -1, \\ -x-1, & x < -1. \end{cases}$

Аналогично $|x-1| = \begin{cases} x-1, & x \geq 1, \\ -x+1, & x < 1. \end{cases}$

а) Рассмотрим наше уравнение при $x \leq -1$, оно равносильно уравнению $-x+1-x-1=2$, $-2x=2$, $x=-1$, Это число принадлежит множеству $x \leq -1$.

б) Пусть теперь $-1 < x \leq 1$, тогда данное уравнение равносильно уравнению $-x+1+x+1=2$, $0 \cdot x=0$, последнему уравнению удовлетворяет любое число, но так как мы рассматриваем множество $-1 < x \leq 1$, значит, этому уравнению удовлетворяют все числа из этого множества.

в) Рассмотрим случай $x > 1$. Уравнение равносильно уравнению $x-1+x+1=2$, $x=1$. Число $x=1$ мы получили уже в пункте б).

Ответ: уравнению удовлетворяют все числа, удовлетворяющие условию $-1 \leq x \leq 1$. ▲

Уравнения с параметром

Рассмотрим уравнение $(a-3)(a-2)x = (a-3)(a+5)$. Такие уравнения носят название «уравнения с параметром». Здесь x – неизвестное, а a – параметр. Требуется найти решение x при любых значениях параметра a .

Если $a = 3$, то уравнение принимает вид: $0 \cdot x = 0$, этому уравнению удовлетворяет любое число x , т. е. в этом случае уравнение имеет бесконечно много решений.

Если $a = 2$, то уравнение принимает вид: $0 \cdot x = -7$, это уравнение не имеет решений.

Если $a \neq 3$ и $a \neq 2$, то обе части уравнения можно разделить на $(a-3)(a-2)$, тогда получаем: $x = \frac{(a-3)(a+5)}{(a-3)(a-2)} = \frac{a+5}{a-2}$. Таким образом, если $a \neq 3$ и $a \neq 2$, то уравнение имеет единственное решение и при этом $x = \frac{a+5}{a-2}$.

§5. Графики функций $y = kx + b$ и $y = |x|$

Вам уже известно из школьного курса, что графиком функции $y = kx + b$ является прямая. Для построения графика достаточно указать две точки, принадлежащие прямой, и затем через эти две точки провести прямую.

Пример 1. Постройте график функций: а) $y = 2x + 3$; б) $y = 2$.

Δ а) При $x = 0$; $y = 3$; при $x = 1$; $y = 5$. Проводим прямую через точки $(0; 3)$ и $(1; 5)$. График прямой приведён на рис. 1.




Рис. 1




Рис. 2

б) Для любого значения x значение $y = 2$. Графиком этой функции является прямая, параллельная оси Ox и проходящая через точку $(0; 2)$. График этой функции приведён на рис. 2. ▲

Построим теперь график функции $y = |x|$. Из определения модуля числа следует, что

$$y = \begin{cases} x, & \text{если } x > 0, \\ 0, & \text{если } x = 0, \\ -x, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

При $x \geq 0$ $y = x$, графиком функции при $x \geq 0$ является часть прямой $y = x$. А при $x < 0$ графиком функции является часть прямой $y = -x$. График функции $y = |x|$ приведён на рис. 3.




Рис. 3

Пример 2. Постройте график функции $y = |x+1| - |x-2|$.

Δ Выражение $x-2$ равно нулю при $x=2$. Если $x > 2$, то $x-2 > 0$, поэтому $|x-2| = x-2$. А если $x < 2$, то $x-2 < 0$, тогда $|x-2| = -(x-2) = -x+2$. Выражение $x+1$ равно нулю, если $x = -1$. Если $x > -1$, то $x+1 > 0$, тогда $|x+1| = x+1$. А если $x < -1$, то $x+1 < 0$, тогда

$$|x+1| = -(x+1) = -x-1.$$

Пусть $x \geq 2$, тогда $|x-2| = x-2$, $|x+1| = x+1$, поэтому $y = x+1 - (x-2) = 3$.

Если $-1 < x < 2$, то $|x-2| = 2-x$, $|x+1| = x+1$, тогда $y = x+1 - 2+x = 2x-1$.

Если $x \leq -1$, то $|x+1| = -x-1$, $|x-2| = 2-x$, тогда $y = -x-1 - 2+x = -3$.

Таким образом, $y = \begin{cases} 3, & \text{если } x \geq 2; \\ 2x-1, & \text{если } -1 < x < 2; \\ -3, & \text{если } x \leq -1. \end{cases}$




Рис. 3

Заметим, что прямая $y = 2x-1$ проходит через точки $(-1; -3)$ и $(2; 3)$. График данной функции приведён на рис. 4.

Пример 3. Постройте график функции $y = \begin{cases} |x-3|, & x \geq 0; \\ |x+4| - 1, & x < 0. \end{cases}$

Используя график функции, определите, сколько будет точек пересечения графика функции с прямой $y = a$ при различных значениях параметра a .

Δ Из определения модуля следует, что

$$|x-3| = \begin{cases} 3-x, & \text{если } x \in [0; 3]; \\ x-3, & \text{если } x > 3. \end{cases}$$

$$\text{Далее } |x+4|-1 = \begin{cases} 4-x-1, & \text{если } x \leq -4; \\ x+4-1, & \text{если } x \in (-4; 0). \end{cases}$$

График данной функции приведён на рис. 5.

Если $a < -1$, то прямая $y = a$ не пересекает график данной функции.

Если $a = -1$, то прямая пересекает график функции в точке $(-4; -1)$.

Если $a \in (-1; 0)$, то будет две точки пересечения.

Если $a = 0$, то прямая $y = 0$ пересекает график функции в точках $(-5; 0)$, $(-3; 0)$, $(3; 0)$.

Если $a \in (0; 3)$, то получается 4 точки пересечения.

Если $a = 3$, то будет 3 точки пересечения.

Если $a > 3$, то будет 2 точки пересечения. ▲




Рис. 5

Контрольные вопросы

1(1). Запишите произведение одночленов

$$-\left(3\frac{1}{3}\right)^2 a^5 (b^3)^3 c^2 (-3)^3 (a^7)^2 b (c^2)^3$$

в виде одночлена стандартного вида. Определите степень этого одночлена.

2(1). Преобразуйте выражение

$$(2x^2y + xy + xy^2)(x^2y - xy) - 2x^4y^2 + x^2y^2 + x^2y^3$$

в многочлен стандартного вида и определите его степень.

3(2). Упростите выражение

$$\left(\frac{2m}{2m+n} - \frac{4m^2}{4m^2+4mn+n^2} \right) : \left(\frac{2m}{4m^2-n^2} + \frac{1}{n-2m} \right).$$

4(2). Разложите на множители квадратный трёхчлен $-2x^2 - 7x + 4$.

5(4). Сократите дробь $\frac{3x^2 - 14x - 5}{4x^2 - 21x + 5}$.

6(3). Являются ли данные уравнения равносильными:

а) $|x+5|=3$ и $2x+3=3(x-1)+8$;

б) $|x-1|=-1$ и $x^2+1=0$;

в) $\frac{(x-1)(x-2)}{(x-1)}=0$ и $(x-1)(x-2)=0$.

7(2). Решите уравнение $|3x-7|=|2x-4|$.

8(3). Решите уравнение $ax+2=3x+a$ для любого значения параметра a .

9(3). Решите уравнение $\left| \frac{x+9}{x-5} \right| = x+9$.

10(3). Постройте график функции

$$y = \begin{cases} |x-1|, & \text{если } x \geq 0; \\ x+1, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

Задачи

1(3). (Из сборника задач для гимназий XIX века).

Не используя калькулятор, найдите значение выражения:

$$\left(\frac{(1,09 - 0,29) \cdot 1\frac{1}{4} + (11,81 + 8,19) \cdot 0,02}{\left(18,9 - 16\frac{13}{20}\right) \cdot \frac{8}{9}} : 0,1 \right)$$

2(4). Разложите многочлен на множители:

а) $x^4 - 10x^2 + 9$;

б) $4x^2 + 3xy - y^2$.

3(2). Найдите наименьшее значение квадратного трёхчлена $x^2 - 5x + 9$.

4(2). Найдите наибольшее значение квадратного трёхчлена

$$-5x^2 + 10x - 3.$$

5(3). Решите уравнение: $5|x-1| - 2|x+3| = 1$.

6(2). Решите уравнение для любого значения параметра a :

$$(a-4)(a+7)x = (a-4)(a-8).$$

7(4). Постройте график функции

$$y = \begin{cases} |x-2|, & \text{если } x \geq 1; \\ |x|, & \text{если } x \in (-1; 1); \\ |x+2|, & \text{если } x \leq -1. \end{cases}$$

Используя график функции, укажите, сколько корней имеет уравнение $y(x) = a$ при различных значениях параметра a .

8(3). (МГУ, геологический факультет). Для каждого значения параметра a найти все x , удовлетворяющие равенству $\frac{a}{2a-x} = 3$.

9(3). (МГУ, филологический факультет).

Имеется 40 литров 0,5% раствора и 50 литров 2% раствора уксусной кислоты. Сколько литров первого раствора нужно добавить во второй раствор, чтобы получился 1,5 % раствор уксусной кислоты?

10(3). Из пункта A в пункт B , расстояние между которыми 60 км, одновременно выехали автобус и автомобиль. В пути автомобиль сделал остановку на 3 мин., но в пункт B прибыл на 7 мин раньше автобуса. Найдите скорости автомобиля и автобуса, если известно, что скорость автобуса в 1,2 раза меньше скорости автомобиля.

11(3). Первый автопогрузчик работает вдвое быстрее второго, а вместе они загружают вагон за 10 часов. Известно, что сначала работал только первый, а потом они работали вместе, в результате чего вся погрузка заняла 11 часов. Сколько часов работал только первый автопогрузчик?

12(3). Сумма цифр двузначного числа равна 11. Если это число разделить на разность его цифр, то в частном получится 24 и в остатке 2. Найдите исходное число.